

## Välkommen



## Program

- ✓ Stängsel
- ✓ Inför betessläppet
- ✓ Betets avkastning – djurens behov
- ✓ Betesmodeller
- ✓ Betesplanering
- ✓ Hälsa
- ✓ Tillväxt och slakt
- ✓ Betesvård, naturvård önskade växter



## Tänk rätt när du sätter upp stängslet

- Satsa på att få bra hörn; strävor och rejäla stolpar
- Tillräckligt bra kvalitet på materialet
- Fjädring i elstängslet
- Bra jordning
- ”Djuren har mycket mer tid än du att hitta stängselfel”



## Elstängsel



- Trådhöjd: 30 + 60 + 90 cm (20+40+80)
- Rovdjursstängsel 20+40+60+90+120 cm
- Trästolpar till permanenta stängsel
- Plaststolpar smidigt till tillfälliga stängsel



## Elnät, rulletråd



## Fårnät



- Ringlock



- Vindknut



- Självlåsande knut

Olika beteckningar:  
90 – 5 – 30  
anger höjd i cm – antal horisontella trådar – maskbredd

FS 635 EP = FårStängsel med 6 horisontella trådar 35 tum högt av bästa kvalitet



## Betet är billigaste fodret!

- Beta så länge som möjligt per säsong
- Slipper skörda, lagra, utfodra
- Men bete kräver skötsel



Hur många djur kan jag ha per hektar?  
OBS! Tveksamt, Grovt riktmärke!

Djurslag	Åkermarksbete		Hagmarksbete	
	För-sommar	Sen-sommar	För-sommar	Sen-sommar
Häst	4	2	2	1
Kviga <1 år	8	4	4	2
Kviga >1 år	4	2	2	1
Tjur ca 1 år	6	3	3	1,5
Stut <1 år	8	4	4	2
Stut >1 år	4	2	2	1
Diko + kalv	3	1,5	1,5	0,75
Tacka+lamm	6	3	3	1,5

## Betesåtgång, kg ts, tackor/hektar

- |              | kg ts | vall     | naturbete |
|--------------|-------|----------|-----------|
| • Vår-lamm   | 270   | 10-15 st | 5-6 st    |
| • Sommarlamm | 350   | 8-9 st   | 4 st      |
| • Höstlamm   | 450   | 6-7 st   | 3 st      |

## Betestyper

Naturbete



Jämn avkastning under säsong  
Svårskött  
Trivsamt


Åkerbete





Hög avkastning  
Lättskött

## Naturbetesmarker

Artrika  
Omtyckta av djuren  
= Vackra Sverige  
Jämn avkastning  
EU-stöd  
Håll lagom väl betad  
Håll öppen  
Håll näringsfattig  
Hävda  
kulturvärden





- ## Betesmodeller
- En fälla hela säsongen – mindre lyckat för fåren och betesmarken men bekvämt för ägaren
  - Rotationsbete – 60 tackor/ha i 3 dagar och byte mellan 7 fällor
  - Förbete – lammen äter det bästa "framför" tackorna
  - Stripbetning – en remsa betas i taget
  - Annan betesteknik – ex naturbeten först, vallbeten sedan

- ## Betesplanering är
- att rätt djur ska beta rätt mark vid rätt tidpunkt för att få önskad tillväxt på djuren och önskad skötsel på betesmarken, oavsett väder.  
= EN SVÅR KONST!!!
- 

- ## Verktyg för betesplanering
- ♦ Naturbetesmarker = Betesfälla men inte rastfälla/vinterhage
  - ♦ Fällindelning –fåren mer selektiva ju mer de har att välja på – fällindela mera. Småfällor i början, större i slutet av säsongen
  - ♦ Tidpunkt för betessläpp 3-5 cm
  - ♦ Olika djurgrupper, efter parasitkänslighet och näringsbehov
  - ♦ Olika djurarter, årsvis eller växelvis under säsongen
  - ♦ Plan för flytt
  - ♦ Putsa? Direkt när du tagit bort djuren
  - ♦ Vallar = buffert
  - ♦ Uppfödningsmodell
  - ♦ Betesfria år?
- 

- ## Planera för slakt vid betäckning?
- När vill du slakta dina lamm?  
Vad ska de väga vid slakt?  
Hur stort är slaktutbytet?  
Hur lång tid behöver de på sig för att växa?
- Exempel: För att kunna få slaktlamm som väger 18 kg slaktad vikt i oktober måste lamm som föds i april växa minst 230 gram per dag om slaktutbytet är 40 %
- Gör en tillväxtplan!  
Betäck i tid!
-

## Låg beteskonsumtion

- Överbetat
- Glest bete
- Förvuxet bete
- Osmakligt: arter, gödlat, skugga
- Blött
- Dålig hygien: gödsel, mögel
- Dåligt väder
- Avtagande dagslängd



## När ska man tillskottsutfodra?

- Betet ger för lite. Väg djur, titta på betet
- Mineral och salt, alltid om du inte ger kraftfoder
- Vatten, alltid
- Vid dåligt väder, blött bete
- Vid sjukdom. Diarré, risk för magont
- Betessläpp på frodiga vallar; hö

## Hälsa

- Diarré – parasiter, ohygieniskt foder, för mycket protein
- Hosta – bakterier, virus, damm
- Fästingar – snabbt förlopp på vissa marker
- Gasbrand – snabbt förlopp, går att vaccinera
- Klövproblem – ska åtgärdas och inte lånas eller köpas
- Parasiter – A och O att ha koll för att få bra resultat
- E-vitamin, selen, koppar
- Förgiftning; växter, vatten

## Parasiter

- Stora leverflundran – kolla slaktavräkningen
- Stora magmasken – träckprov, avmaskning före släppet
- Övriga – träckprov, avmaskning av lamm på betet

Betesplanera för att bemästra parasiterna  
Köp inte på dig parasiter  
Stora leverflundran smittar även nötkreatur


## Inför betessläppet

- Avmaskade tackor vid behov
- Vaccinerade tackor?
- Parasitfria välkomstbeten för lammen
- Mjuk övergång till bete på vall
- Fungerande stängsel
- Mineraler och saltsten
- Alla djur märkta
- Vattentillgång




## Växter som kan ge förgiftning

- Bergsyra, brakved, dån, ek, grässtjärnblomma, harsyra, tussilago, höskallra, johannesört, korsört, kärrfräken, luddtåtel, löktrav, malört, nattskatta, penningört, pilört, plister, renfana, sandlök, sandtrav, sippor, skogsbingel, smörblomma, sommargyllen, stånds, svinmålla, svärdslija, sötväppling, trolldruva, vattenmärke, vildpersilja, violer, åkerfräken, åkermolke, åkersenap, ängsbrämsa, ängssyra och örnbräken.




## Oönskade växter

- Rölleka
- Skräppa
- Veketåg
- Åkertistel
- Älgört
- Brännässla
- Hundkåx
- Kardborre
- Maskros
- Revsmörblomma





## Valletablering

- Renbestånd
- Skyddsgröda
  - Spannmål
  - Spannmål med ex ärter, åkerböna, vicker
  - Ettårigt rajgräs




## Bra vallfoder

- > 35 % ts
- > 11,0 MJ/kg ts
- 120 – 170 g rp/kg ts
- 65 – 75 g AAT/kg ts
- 450 – 530 g NDF/kg ts

## Vallfrö

- Beror på vad du ska ha vallen till
- Jordart
- Klimat
- Jordens näringsinnehåll
- Om ekologisk ca 30% klöver/baljväxt



## Vallskörd

- När – följ [vallprognos.se](http://vallprognos.se), ensilage månadsskiftet maj/juni hö före midsommar
- Andraskörd 5- 6 veckor efter förstaskörd



Hushållnings  
sällskapet